

اختلالات کف لگن در زنان

۱- امکان بروز کدام عارضه عصبی زیر بدنبال جراحی ترمیمی پاراواژینال شکمی و برج محتمل است؟

✓ ناتوانی در اداکسیون ران

از دست دادن حس قسمت خارجی ران

درد در حالت نشستن

درد در ناحیه سوپرا پوبیک

منبع:

تلیندز 2020

۲- خانم 48 ساله مورد شناخته شده هیپرلیپیدمی و بیماری ایسکمیک قلبی، در حال مصرف داروی های ضد چربی استاتینی، Clopidogrel، بتا بلوکر و NSAID می باشد. در حال حاضر کاندید TVH+APR است. تمام داروهایش بایستی قبل از جراحی قطع گردد بجز:

✓ ضد چربی استاتینی

Clopidogrel

NSAID

بتا بلوکر

منبع:

تلیندز 2020

۳- بیماری که کاندید هیسترتومی بوده و از دیشب تاکنون ناشتا است، به ناگهان 2 ساعت قبل از جراحی یک لیوان چایی میل کرده است. چه مقدار دیگر زمان لازم است NPO بماند تا بتوان جراحی را شروع کرد؟

4 ساعت

6 ساعت

8 ساعت

✓ بلافاصله

منبع:

تلیندز 2020

آزمون: اختلالات کف لگن در زنان مدت آزمون: 120

۴- بیمار خانم 70 ساله، بعد از جراحی لفورت برایش Retrograde voiding trial انجام شده که بیمار قادر به ادرار کردن نبوده، در معاینه شواهدی به نفع انسداد مجرا نیست. مناسب ترین اقدام درمانی کدام است؟

✓ آموزش CIC و فالوآپ بیمار 3 روز بعد بصورت سرپائی جهت چک مجدد رزیدو

درمان دارویی جهت رفع احتباس ادراری

بستری در بیمارستان جهت سونداژ دایم برای یک هفته و چک مجدد رزیدو

انجام تست یورودینامیک برای بررسی علت احتباس

منبع:

Up to date 2022

۵- در بررسی هیستروسالپینگوگرافی خانم نابارور در دو سیکل، انسداد دوطرفه پروگزیمال لوله گزارش شده است. کدام اقدام زیر قبل از درمان ART می تواند با درصد حاملگی بیشتر همراه باشد؟

تکرار HSG سه ماه بعد

فلورسکوپی

✓ عبور گایدوایر از لوله با کمک هیستروسکوپی لاپاراسکوپی

رزکسیون قسمت اینترستیشیال با آناستوموز ایسم - کورنه

منبع:

تلیندز 2020

۶- بعلت بیرون زدگی سرویکس هیپرتروفیه از واژن در خانم 47 ساله، کاندید TAH شده، برای جلوگیری از کوتاه شدن واژن در زمان جدا کردن کاف واژن، اقدامات زیر صحیح است بجز:

✓ استفاده از تکنیک کاف بسته

استفاده از تکنیک کاف باز

بریدن دور تا دور سرویکس با قیچی Jorgenson

استفاده از Sponge Stick در فورنیکس قدامی واژن

منبع:

تلیندز 2020

آزمون: اختلالات کف لگن در زنان مدت آزمون: 120

Aa = 0cm	Ba = 0cm	C = -4cm	-۷
Gh = 4cm	Pb = 3cm	TVL=9cm	
Ap= -2cm	Bp= -2cm	D= -6cm	

بیمار با شکایت بی اختیاری ادرار بدنبال سرفه کردن و خندیدن مراجعه کرده است. سابقه جراحی مدیکال ندارد و تست سرفه در زمان معاینه مثبت است. با توجه به معاینه POP-Q، اقدام بعدی قبل از عمل جراحی کدام است؟

سیستوسکوپی

تست اورودینامیک کمپلکس

اندازه گیری حجم باقیمانده ادرار (PVR)

چک کراتنین



منبع:

تلهپندز 2020

۸- در خانم 43 ساله که بدلیل پرولاپس آپیکال لگنی تحت ترمیم ساسپنشن لیگامان ساکرواسپینوس قرار گرفته است و پس از ترمیم دچار بی اختیاری استرسی ادرار، درد حین نشستن و درد ناحیه پرینه شده که البته شب بیمار را از خواب بیدار نمی کند. کدام اقدام درمانی زیر پیشنهاد می کنید ؟

نورولیز

باز کردن سوچر ساکرواسپینوس

درمان انتظاری با تزریق ماده بی حسی

پیوند عصب



منبع:

تلهپندز 2020

۹- در حین هیستریکتومی شکمی، سیستوتومی ناخواسته اتفاق افتاده است. جراح ترمیم دیواره مثانه با اینترپوزیشن بافتی، با نخ ویکریل 2-0 انجام داده است. جهت تخلیه مایع احتمالی، کاف واژن را باز گذاشته و سوند فولی مثانه، بمدت 7-10 روز بعد از جراحی فیکس کرده است. تمام اقدامات انجام شده در این بیمار صحیح است بجز:

ترمیم دیواره مثانه با نخ ویکریل 2-0

باز گذاشتن کاف واژن برای تخلیه مایع احتمالی

اینترپوزیشن بافتی

فیکس کردن سوند فولی مثانه بمدت 7-10 روز بعد از جراحی



منبع:

تلهپندز 2020

آزمون: اختلالات کف لگن در زنان مدت آزمون: 120

۱۰- نوزاد سه روزه ای را بعلت احتباس ادراری به اورژانس آورده اند. در معاینه تشخیص موکوکولپوس ثانویه به هایمن ایمپرفوره داده می شود. اقدام صحیح کدام است؟

آسپیراسیون موکوس واژن

سونداژ مٹانه و Observe بمدت 2 هفته

MRI لگنی جهت بررسی سطح انسداد واژن قبل عمل

هایمنکتومی ✓

منبع:

تلیندز 2020

۱۱- خانم 21 ساله NG با کیست آندومترئومی 10 سانتیمتر تخمدان، کاندید جراحی شده است. برای کاهش عود و حفظ عملکرد تخمدان کدام اقدام توصیه می شود؟

تخلیه محتویات کیست و فولگراسیون دیواره کیست

سیستکتومی با کمک Stripping دیواره کیست ✓

استفاده از Bipolar Desiccation جهت برقراری هموستاز

استفاده از الکتروکوتری بجای بخیه زدن

منبع:

تلیندز 2020

۱۲- بیمار خانم 40 ساله با سابقه آسم مزمن که بعلت پرولاپس، 2 سال قبل تحت TVH قرار گرفته است. با خروج توده مراجعه ، در معاینه کاف واژن stage 3 و کمپارتمان قدامی stage 1 می باشد. کدام روش جراحی برای ایشان مناسب تر است؟

مک کال کلدوپلاستی

های یوتروساکرال ساسپنش واژینال

ساسپنش ساکرواسپینوس

آبدومینال ساکروکولپوپکسی ✓

منبع:

تلیندز 2020

۱۳- در هیسترکتومی واژینال جهت تسهیل خروج رحم های بزرگ در چه مرحله ای Bivalve می کنیم؟

بعد از جدا کردن لیگامان کاردینال

بعد از جدا کردن لیگامان یوتروساکرال

بعد از بستن عروق یوترین ✓

بعد از بستن عروق یوترواوارین

منبع:

تلیندز 2020

۱۴- بیماری در اتاق عمل تحت جراحی ساکروکولوپوکسی شکمی قرار دارد. درخواست کدام رتراکتور را برای بلند کردن و کشیدن دیواره شکم توسط جراح بهتر است؟

Deaver

Heany

Briesky

Richardson



منبع:

تلیندز 2020

۱۵- بیمار خانم 54 ساله بدنال جراحی لگن دچار DVT شده، او سابقه مشکل کلیوی داشته و هم اکنون کراتینین خونش برابر 4 می باشد. در صورتیکه بخواهید برای درمان اولیه مونوتراپی انجام دهید کدام دارو انتخاب شماست؟

Rivaroxaban



Unfractionated Heparin

Fundaparinox

Dabigatran

منبع:

تلیندز 2020

۱۶- بیمار خانم 28 ساله با توجه به آنومالی متعدد جنینی کاندید سقط القایی شد. بدلیل خونریزی زیاد تحت واکنوم - آسپیراسیون قرار گرفت. روز بعد از عمل بیمار دچار تب 38.8 درجه سانتیگراد شد و در سونو انجام شده 2cm retained tissue دیده شد. علاوه بر دادن آنتی بیوتیک، کدام اقدام زیر صحیح است؟

تخلیه رحم از بقایای حاملگی



تجویز میزوپروستول

تحت نظر گرفتن با کنترل تب

تجویز اکسی توسین

منبع:

تلیندز 2020

آزمون: اختلالات کف لگن در زنان مدت آزمون: 120

۱۷- خانمی با تب 38.5 درجه سانتی گراد و تاکی کاردی مراجعه کرده است. تندرینس آدنکس و CMT مثبت (حرکت دردناک سرویکس) دارد. شکم نرم است و تهوع و استفراغ ندارد. در سونوگرافی انجام شده، جنین زنده داخل رحمی 9 هفته و آبسه توبووارین سمت راست گزارش شده است. علاوه بر هیدراتاسیون و شروع آنتی بیوتیک، کدام اقدام ضرورت دارد؟

الف) بستری کردن بیمار و انجام کلدوستنتر

ب) ختم حاملگی و ادامه آنتی بیوتیک وریدی

ج) آدنکسکتومی سمت راست و بررسی همزمان آپاندیس

د) بستری کردن بیمار و تجویز انوکسپارین پروفیلاکسی



منبع:

تلیندز 2020

۱۸- در زمان انجام D&C به دلیل تنگی سرویکس امکان دیلاتاسیون با هگار وجود ندارد. کدام یک از روش های زیر برای فائق آمدن به این مشکل کارایی ندارد؟

تیغ شماره 11 برای سوراخ کردن محل تنگی

دیلاتورهای فلزی مجرای اشکی

سونوگرافی برای شناسایی کانال سرویکس

میزوپروستول حین عمل



منبع:

تلیندز 2020

۱۹- در بررسی خانمی با شکایت اختلال عملکرد جنسی بصورت ثانویه، ارزیابی تستهای زیر ارزشمند است بجز:

Hb

TSH

تستوسترون



معاینه از نظر اسکلرودرما

منبع:

نواک 2020

۲۰- در زمان جراحی TAH+BSO حین گرفتن لیگامان انفانندیبولوپلویک با کلامپ کوخر، جراح متوجه قطع کامل حالب راست

می شود. کدام روش زیر برای ترمیم حالب مناسب است؟

گذاشتن استنت طولانی مدت

یورتروپورتوستومی

اینترپوزیشن یورتروایلئال

یورترونئوسیتوستومی ✓

منبع:

تلیندز 2020

۲۱- بیمار خانم 30 ساله G1P1 با شکایت بی اختیاری مدفوع مراجعه کرده است. در معاینه پارگی اسفنگتر خارجی آنال بدنبال زایمان مشاهده می شود. کاندید اسفنگتروپلاستی می شود. کدامیک از اقدامات زیر در جریان ترمیم اسفنگتروپلاستی صحیح

می باشد؟

بریدن لبه های اسکار موقع آزاد سازی اسفنگتر خارجی

فراتر رفتن، دیسکسیون لترال از ساعت 3 و 9

استفاده از الکتروکوتر جهت هموستاز

ضرورت شناسایی و بازسازی اسفنگتر داخلی آنال ✓

منبع:

نواک 2020

۲۲- خانمی 70 ساله با پرولاپس کاف واژن، کاندید ساسپنشن ساکرواسپینوس می باشد. در سابقه، به دلیل کانسر سرویکس تحت رادیوتراپی قرار گرفته، جهت دایسکشن فضای پارارکتال در بیمار، ابتدا چه اقدامی انجام می دهید؟

باز کردن فضای پاراوزیکال ✓

جداسازی درجهت خلف

باز کردن با جداسازی کند

پیشروی بین حالب و شریان هایویوگاستر

منبع:

تلیندز 2020

آزمون: اختلالات کف لگن در زنان مدت آزمون: 120

۲۳- برای خانم ۳۰ ساله مبتلا به آبسه بارتولن انسزیون و درناژ انجام شده و کاتتر ورد تعبیه شده است. چه مدت باید کاتتر در محل بماند؟

۳ تا ۵ روز

۱ تا ۲ هفته

۲ تا ۴ هفته

۴ تا ۶ هفته



منبع:

تلیندز 2020

۲۴- خانم ۴۲ ساله با توجه به نقص کمپارتمان قدامی، خلفی و همچنین آنتروسل مخفی کاندید عمل جراحی ساکرواسپینوس ساسپنش و کولپورافی قدامی و خلفی می باشد.. جهت ترمیم آنتروسل کدام یک از روش های جراحی زیر ارجح است؟

کلدوپلاستی مک کال

هالبان کلدوپلاستی

موسکوویچ

تنها جراحی ساکرو اسپینوس



منبع:

تلیندز 2020

۲۵- خانم 70 ساله با توجه به سابقه هیستریکتومی، سیستم شل شدید و نداشتن رابطه جنسی کاندید جراحی کولپوکلایزیس می باشد. کدام گزینه می تواند در این عمل جراحی چالش ایجاد کند؟

عدم تقارن پرولاپس



شدت زیاد پرولاپس

نداشتن رابطه جنسی

سابقه هیستریکتومی

منبع:

تلیندز 2020

آزمون: اختلالات کف لگن در زنان مدت آزمون: 120

۲۶- خانم ۷۵ ساله ای که دو ماه قبل تحت عمل جراحی لفورت قرار گرفته است باتوجه به تب و درد شکمی سونوگرافی انجام داده است که تجمع چرک داخل حفره رحم مشهود است. کدام اقدام درمانی صحیح است؟

درناژ واژینال ترشحات

درمان کانزرواتیو و دریافت آنتی بیوتیک

هیستریکتومی شکمی ✓

درناژ آبدومینال چرک تحت گاید سونوگرافی

منبع:

تلیندز 2020

۲۷- خانم مولتی پار به دنبال زایمان، دچار احتباس جفت شده است. تمام اقدامات زیر جهت خروج جفت کمک کننده است بجز:

یک دست روی فوندوس و دیگری کشش به پایین

کشش مداوم ۳۶۰ درجه بند ناف

تزریق اکسی توسین

تجویز مترژن ✓

منبع:

تلیندز 2020

۲۸- خانم 45 ساله ای را جهت ترمیم آسیب مزمن اسفنکتر آنال به اتاق عمل برده اید. ترمیم کدام یک از بافت‌های آناتومیک زیر را ترجیحا با نخ مونوکریل پیشنهاد می کنید؟

مخاط رکتوم ✓

اسفنکتر داخلی

اسفنکتر خارجی

عضلات بولبوکاورنو

منبع:

تلیندز 2020

۲۹- عمل جراحی خانمی 70 ساله، کاندید جراحی لفورت، به دلیل نداشتن آی سی یو که در پره آپ درخواست شده بود، کنسل شد. آزمایشات بیمار در صورت نرمال بودن، تا چه مدت جهت نوبت بعدی جراحی، قابل قبول است؟

1-2 ماه

4 ماه ✓

6 ماه

12 ماه

منبع:

تلیندز 2020

۳۰- پس از عمل هیستریکتومی لاپاروسکوپیک، بیمار از ناتوانی در مشت کردن دست و بی حسی انگشتان دست شاکی است. در معاینه دفورمیتی Claw hand مشهود است. آسیب کدام عصب مطرح است؟

عصب رادیال

عصب مدین

عصب اولنار ✓

ریشه فوقانی شبکه براکیال

منبع:

تلیندز 2020

۳۱- کدامیک از موارد زیر با افزایش گسیختگی زخم ارتباط دارد؟

دیابت

داشتن اینترکورس

جسم خارجی در زخم

نوع برش ✓

منبع:

تلیندز 2020

۳۲- خانم 45 ساله به دلیل AUB کاندید D&C تشخیصی است. بیمار به دلیل سابقه DVT تحت درمان با Edoxaban است. کدام اقدام صحیح است؟

قطع دارو از 5 روز قبل عمل

تبدیل دارو به انوکسپارین

ادامه مصرف دارو ✓

چک INR جهت اطمینان از بودن در محدوده نرمال درمانی

منبع:

تلیندز 2020

آزمون: اختلالات کف لگن در زنان مدت آزمون: 120

۳۳- بیماری که تحت لابیوپلاستی قرار گرفته است در ویزیت بعد عمل در معاینه، هماتوم در لایبیا سمت راست مشهود است که دردناک است. اقدام صحیح کدام است؟

sitz bath

درناژ بلافاصله ✓

تحت نظر گرفتن

پک کردن

منبع:

تلیندز 2020

۳۴- خانم 75 ساله به دلیل نوتال پروسیدنشا و بی اختیاری استرسی ادرار تحت جراحی TVH+Lefort+TOT قرار گرفته است. یک هفته بعد جراحی، در ویزیت پست آپ باقی مانده ادرار 200 سی سی است و 100 سی سی ادرار کرده است. CIC به بیمار آموزش داده شد. بعد 3 هفته همچنان به خوبی قادر به ادرار کردن نیست و باقیمانده ادرار بالا است. اقدام مناسب کدام است؟

جراحی مجدد با برش عرضی اسلینگ

ادامه CIC ✓

تجویز بتانکول

جراحی و برداشتن مش

منبع:

تلیندز 2020

۳۵- خانم 30 ساله یک سال قبل به دنبال زایمان طبیعی سخت و طول کشیده با فیستول و زیکوواژینال متعاقب آن تحت عمل جراحی قرار گرفته است و از آن زمان تا بحال از بی اختیاری ادرار با عطسه و سرفه شکایت دارد. کدام درمان ارجح است؟

TVT

Burch colposuspension

Pubovaginal sling ✓

Urethral agent

منبع:

تلیندز 2020

۳۶- بیماری یک هفته بعد از هیستریکتومی به دلیل درد لگن و ترشح واژینال مراجعه کرده است. در معاینه ترشحات چرکی در کاف واژن مشهود است. در سونوگرافی collection در ناحیه کاف واژن داخل لگن دیده می شود. کدام اقدام درمانی را انجام

می دهید؟

- ✓ درناژ پرکوتانئوس کاف واژن و تعبیه درن
- آنتی بیوتیک وسیع الطیف 48 ساعت
- ارسال ترشحات جهت کشت و درمان بر اساس نتیجه
- تنها تحت نظر

منبع:

تلیندز 2020

۳۷- خانمی با تشخیص آندومتریومای تخمدان کاندید عمل جراحی است. بیمار نگران عود و احتمال بارداری در آینده است. کدام تکنیک جراحی ارجح است؟

- درناژ ساده
- ablation با لیزر
- ✓ اکسیزیون
- کوتر مونوپلار

منبع:

تلیندز 2020

۳۸- خانمی برای بار دوم به دلیل تورشن آدنکس راست کاندید عمل جراحی تورشن است. در کدام روش جراحی اوو فوروپکسی امکان حفظ طول طبیعی لیگامان بعد از دتورت کردن وجود دارد؟

- اتصال به دیواره لگن
- اتصال به لیگامان راند همان سمت
- ✓ چین دادن لیگامان
- اتصال به خلف فوندوس رحم

منبع:

تلیندز 2020

آزمون: اختلالات کف لگن در زنان مدت آزمون: 120

۳۹- خانم 35 ساله با درد شکم و تشخیص احتمالی تورشن تحت لاپاراسکوپی قرار می گیرد. در بررسی ادنکس ها، تورشن تخمدان سمت راست دارد و برجستگی های پاپیلاری در سطح تخمدان ها مشهود است. علاوه بر دتورت کردن اقدام ارجح کدام است؟

بیوپسی تخمدان ✓

افورکتومی همان سمت و بیوپسی سمت چپ

افورکتومی همان سمت

بستن شکم و ارزیابی بیشتر بعد عمل

منبع:

تلیندز 2020

۴۰- در حین لاپاراتومی جراح متوجه خونریزی کوچک در یک فضای محدود شده است. بهترین وسیله برای کنترل این خونریزی کدام است؟

Right angle ✓

Babcock

Adson

Debaquey

منبع:

تلیندز 2020

۴۱- بیمار مورد لاپاراتومی ۸ روز قبل با شکایت ترشحات خونی از زخم و سپس احساس ناگهانی پارگی (popping) و بیرون زدن احشاء از محل زخم مراجعه کرده است. بیمار ۴ ساعت قبل غذا خورده است. تمام اقدامات زیر در این بیمار صحیح است بجز:

برگرداندن روده با دستکش استریل به داخل شکم

شروع آنتی بیوتیک وسیع الطیف

ارسال آزمایشات الکترولیت سرم

انتظار تا کامل شدن زمان NPO ✓

منبع:

تلیندز 2020

۴۲- بیمار خانم ۳۸ ساله با سونوگرافی مبنی بر میومهای متعدد رحم که بزرگترین آن ۷ سانتیمتر می‌باشد، مراجعه کرده است. بیمار تمایل به حفظ باروری در آینده را دارد. در MRI با و بدون کنتراست بیش‌تر از ۴ میوم با وسکولاریته ضعیف همراه با آدنومیوز شدید گزارش شده است. همه گزینه‌های زیر کنترااندیکاسیون انجام High Frequency magnetic resonance – Guided ultrasound در این بیمار است بجز:

✓ سائز ۷ سانتیمتری میوم

تعداد میوم بیشتر از ۴

واسکولاریته ضعیف

آدنومیوز شدید

منبع:

تلیندز 2020

۴۳- حین انجام ساسینشن لیگامان ساکرواسپینوس سوچورهای ساسینشن نزدیک به نیمه فوقانی لیگامان زده شد. بیمار به طور ناگهانی دچار خونریزی شد. علائم حیاتی بیمار پایدار بود، ابتدا با سوچور و پک سعی در کنترل خونریزی کردیم. اقدام مناسب بعدی کدام است؟

لاپاراتومی

لاپاراسکوپی

✓ آمبولیولیزیشن

کوتر

منبع:

تلیندز 2020

۴۴- تمام گزینه‌های زیر در مورد ساکروهیستروپیکسی در مقایسه با ساکروکولپوپیکسی صحیح است بجز:

✓ اکسپوژر بیش‌تر مش

از دست دادن کمتر خون

بازگشت سریع‌تر به کار

زمان کوتاه‌تر جراحی

منبع:

تلیندز 2020

آزمون: اختلالات کف لگن در زنان مدت آزمون: 120

۴۵- بیماری صبح روز بعد از هیستریکتومی دچار درد حاد شکم شده، در معاینه علائم پریتونیت دارد. با شک به یورینوما جهت بیمار سی‌تی‌اسکن با کنتراست وریدی انجام شد و تشخیص آسیب مثانه تایید شد ولی حال سالم است. اولین اقدام کدام است؟

✓ درن پرکوتانئوس جهت تخلیه مثانه

تحت نظر قرار دادن بیمار

لاپاراتومی تجسسی اورژانس

نفروستومی

منبع:

تلیندز 2020

۴۶- حین انجام کولیوساسپنشن رتروپوبیک برای بی‌اختیاری استرسی ادرار متوجه عبور سوچورها از مثانه با سیستوسکوپی شده‌ایم ولی مثانه پاره نمی‌باشد. علاوه بر، برداشتن سوچور، بهترین اقدام کدام است؟

عدم نیاز به اقدام خاص

✓ تعبیه مجدد

ترمیم مثانه و تعبیه مجدد

توقف عمل

منبع:

تلیندز 2020

۴۷- بیمار خانم ۳۰ ساله با تشخیص بارداری خارج رحم بینابینی تحت لاپاراتومی و سالپنژکتومی قرار گرفته است. حین عمل ساک بارداری و ویلی کوریونی رویت شد. در توصیه‌های حین ترخیص و توضیحات به بیمار تمام موارد زیر صحیح است بجز:

ادامه خونریزی واژینال تا ۲ هفته

بازگشت پریود طی ۸ هفته

فاصله تا بارداری بعدی ۳ تا ۶ ماه

✓ تاکید به بیمار برای فالوآپ با BHCG طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از عمل

منبع:

تلیندز 2020

۴۸- بیمار بعد از انجام NVD دچار خونریزی واژینال شدید شده است. علیرغم تمام معاینات منشا خونریزی مشخص نیست و بیمار دچار خونریزی از محل کاتتر وریدی نیز شده است. ارسال تمام آزمایشات زیر در این بیمار ضروری است بجز:

D-DIMER ✓

فیبرینوژن

چک پلاکت

FDP

منبع:

تلیندز 2020

۴۹- در پایان هیستریکتومی واژینال خانم 52 ساله بدلیل پرولاپس متوجه خونریزی می شویم. بابت های شریان رحمی و تخمدانی نرمال است. کدام سایت بعنوان منشا خونریزی محتمل تر است؟

کاف خلفی وازن ✓

لیگامان یوتروساکرال

لیگامان کاردینال

لوله رحمی

منبع:

تلیندز 2020

۵۰- به دنبال سزارین با برش فانشتیل بیمار دچار بی حسی در پوست بالای برش شده، احتمال آسیب کدام عصب مطرح است؟

T12

پرفوران ✓

ایلئواینگوئینال

ایلئوهیبیوگاستریک

منبع:

تلیندز 2020

۵۱- استفاده از کدام دارو در کنترل تهوع و استفراغ پس از عمل با عوارض کمتری همراه است؟

Diphenhydramin

Metoclopramide

Phenergan

Ondansetron ✓

منبع:

تلیندز 2020

۵۲- جهت ترمیم کمپارتمان خلفی در خانم 73 ساله که فعالیت سکس هم ندارد و با شکایت incomplete emptyng و splinting مراجعه کرده است کدام روش زیر مناسب تر است ؟

سایت اختصاصی (Site-specific)

روش مرسوم به همراه لواتورپلاستی ✓

ترانس آنال

استارپ (STARP)

منبع:

تلیندز 2020

۵۳- خانم 42 ساله، 4 ماه پیش تحت عمل TOT قرار گرفته است. هم اکنون با شکایت دیسپارونی و درد مدیال ران مراجعه کرده است. در بررسی مش در محل آناتومیک و اکسپوژر مش وجود ندارد. لمس مش در ناحیه پارااورترال باعث تشدید درد بیمار می شود. اقدام مناسب کدام است ؟

اطمینان بخشی

برش عرضی روی مش

شل کردن مش

اکسزیون مش ✓

منبع:

تلیندز 2020

۵۴- اندازه گیری کدامیک در بیماری که تحت درمان شوک هموراژیک قرار گرفته، برای تعیین پرفیوژن ارگانهای انتهایی اختصاصی است ؟

لاکتات سرم ✓

کمبود باز (base deficit)

اشباع اکسیژن وریدی

میزان ادرار (urine output)

منبع:

تلیندز 2020

۵۵- در ساسپنشن رحم، جهت اصلاح رحم رتروورسه از کدام لیگامان استفاده می شود ؟

یوتروساکرال

کاردینال

پوبوسرویکال

راند ✓

منبع:

تلیندز 2020

۵۶- دختر 13 ساله به علت کیست مولتی لوکوله با جز solid یک طرفه تخمدان، آسیت و افزایش AFP و BHCG کاندید جراحی شده است. اقدام مناسب جهت وی کدام است ؟

سیستکتومی

اووفورکتومی یک طرفه ✓

اووفورکتومی دو طرفه

بیوپسی

منبع:

نواک 2020

۵۷- خانم 38 ساله دارای سه فرزند و سابقه TL با سیتولوژی ASC-H تحت کولپوسکوپی و بیوپسی قرار گرفته که نتیجه آن CIN1 بوده است . اقدام مناسب بعدی کدام است ؟

اطمینان بخشی

HPV Typing

LEEP ✓

هیسترکتومی

منبع:

نواک 2020

۵۸- در خانم 65 ساله مبتلا به هیپاتیت مزمن اتوایمیون جهت کنترل اضطراب تمام داروهای زیر کاربرد دارند بجز:

Alprazolam

Oxazepam

Lorazepam

Diazepam ✓

منبع:

نواک 2020

۵۹- خانم 30 ساله بدنبال حاملگی 30 هفته و شروع دردهای زایمانی دچار پارگی رحم شده است . سابقه میومکتومی 2 سال قبل را ذکر میکند. در شرح عمل جراحی : از برش میلارد استفاده شده و پس از زدن برش عمودی روی فیبروم و خروج آن ابتدا بصورت قابل توجه با الکتروسرجری هموستاز برقرار شده و سپس میومتر در چندین لایه ترمیم شده است . کدامیک از فاکتورهای ضمن جراحی قبلی ، خطر پارگی فعلی رحم را توجیه می کند ؟

برش میلارد

برش روی فیبروم

استفاده از الکتروسرجری ✓

نحوه ترمیم میومتر

منبع:

نواک 2020

۶۰- خانم 30 ساله بدلیل دیسمنوره و دردهای لگنی و دیس پارونی با تشخیص آندومتریوزیس به کلینیک مراجعه کرده است . اولین گزینه درمانی کدام است ؟

لوپرولید

ژسترینون

دینوژست ✓

نافارلین

منبع:

نواک 2020

۶۱- خانم 53 ساله بدلیل گرگرفتگی ناشی از یائسگی متقاضی درمان هورمونی است . در کدام رژیم درمانی زیر نیاز به مصرف همزمان پروژستین نمی باشد ؟

Bazedoxifene ✓

Tamoxifen

Venlafexine

Escitalopram

منبع:

نواک 2020

آزمون: اختلالات کف لگن در زنان مدت آزمون: 120

۶۲- بیمار خانم 30 ساله که تحت لاپاراتومی اوو فورکتومی قرار گرفته است. با تب 40 درجه، مجدداً بستری شده است. برای هیدراتاسیون بیمار کدام مناسب است؟

- ✓ دکستروز 5%
- رینگر لاکتات
- نرمال سالین
- دکستران

منبع:

نواک 2020

۶۳- خانم 35 ساله با سابقه دو نوبت سقط سه ماهه اول جهت بررسی به کلینیک مراجعه کرده است. ارزیابی هورمونی آندوکراین برای وی درخواست می کنید. بیمار در خصوص بررسی همسر خود می پرسد. کدام تست را برای همسر وی توصیه می کنید؟

- ✓ کاریوتایپ خون محیطی
- سونوگرافی بیضه
- آنالیز اسپرم
- تست تزریقی پاپاورین

منبع:

نواک 2020

۶۴- پزشکی که به حقوق خصوصی ماندن اسرار بیمار احترام می گذارد کدام اصل را رعایت میکند؟

- ✓ خود مختاری
- شایستگی
- فایده رسانی
- حفظ اسناد

منبع:

نواک 2020

۶۵- خانم ۲۵ ساله با کاندیدای واژینال مراجعه کرده است. در صورتیکه بیمار متقاضی کوتاهترین دوره درمانی باشد، از بین داروهای زیر کدامیک پیشنهاد می کنید؟

- ✓ کرم بوتو کونازول
- کرم کلوتریمازول
- قرص نیستاتین
- کرم مایکونازول

منبع:

نواک 2020

۶۶- خانم منویوز ۶۰ ساله با شکایت دیسپارونی و علایم ادراری مراجعه کرده است. در معاینه آتروفی شدید ناحیه ولوواژینال دارد. کدام گزینه در مورد مصرف استروژن واژینال در این بیمار صحیح است؟

✓ امکان تجویز تا یکسال بدون نگرانی

نیاز به استفاده همزمان از پروژسترون سیستمیک

بهبود قابل توجه بی اختیاری ادرار

افزایش خطر کانسر برست

منبع:

نواک 2020

۶۷- خانم ۴۰ ساله تحت تجاوز جنسی قرار گرفته است. کدام توصیه به ایشان صحیح است ؟

✓ بررسی سرمی سیفلیس

ایمونوگلوبولین HBV

واکسن HPV

تست سریال HIV تا 3 ماه

منبع:

نواک 2020

۶۸- برای خانم ۴۰ ساله ای که با توجه به افسردگی قرار است بوپروپیون تجویز کنید، سابقه کدام یک از موارد زیر می تواند جهت تجویز دارو در ایشان مشکل ساز باشد؟

✓ سابقه تشنج

اختلال عملکرد جنسی

مصرف سیگار

سابقه بولیمیا

منبع:

نواک 2020

آزمون: اختلالات کف لگن در زنان مدت آزمون: 120

۶۹- معاینه POPQ خانم 65 ساله و فعال از نظر جنسی با خروج توده به شرح زیر است. ایشان را کاندید کدام عمل جراحی می کنید؟

Aa = +1 cm	Ba =+ 4 cm	C =+ 5 cm
GH = 6cm	PB = 3cm	TVL = 8cm
Ap =+1cm	Bp =+2cm	D =-4 cm

partial colpocleisis

Abdominal sacrocolpopexiy

Sacrospinous suspention + APR

TVH+ high uterosacral + APR



منبع:

نواک 2020

۷۰- بیمار خانم 62 ساله با پرولاپس آپیکال stage 3 مراجعه کرده است. در عمل، جراح وارد فضای پارارکتال فاشیای دنولیر می شود. کدام روش جراحی زیر برایش در حال انجام است؟

کلدوپلاستی مک کال

موسکوویچ

ساسپنشن های یوتروساکرال

ساسپنشن ساکرواسپینوس



منبع:

نواک 2020

۷۱- در بررسی ایلئوس بعد از جراحی سزارین ، جراح متوجه می شود که گاز در شکم بیمار جا مانده است. در مورد توضیح این حادثه به بیمار نظر شما چیست؟

برای جلوگیری از نگرانی بیمار، توضیح آن ضرورتی ندارد

چون نیاز به اقدام جراحی دارد، باید به بیمار توضیح داد.

در صورت توضیح به بیمار ، احتمال شکایت کاهش می یابد



بسته به نظر پزشک تصمیم گیری شود

منبع:

نواک 2020

آزمون: اختلالات کف لگن در زنان مدت آزمون: 120

۷۲- خانمی 41 ساله با سابقه آمبولیزاسیون شریان رحمی به علت میوم علامت دار، در سن حاملگی 18 هفته برای انجام مراقبت های بارداری به شما مراجعه کرده است. کدام اقدام زیر را به ایشان پیشنهاد می کنید؟

توصیه به ختم بارداری

سونوگرافی و بررسی پلاستنا آکرتا ✓

سزارین همزمان با هیستریکتومی در ترم

عدم نیاز به ارزیابی بیشتر

منبع:

نواک 2020

۷۳- در بررسی علت درد مزمن لگنی بیماری با سابقه TAH+BSO، سندروم بقایای تخمدان (ovarian remnant syndrome) تشخیص داده شده است. برای یافتن آسان تر بافت تخمدان حین جراحی استفاده از کدام یک از داروهای زیر قبل از عمل توصیه می شود؟

آگونیست های GNRH

پروژسترون با دوز بالا

کنتراسپتیو های ترکیبی

کلومیفن سیترات ✓

منبع:

نواک 2020

۷۴- در ویزیت بعد از عمل بیماری که شب گذشته تحت جراحی سزارین با برش فان اشتیل قرار گرفته است، بیمار از درد شدید محل عمل در موقعیت جانبی نسبت به عضله رکتوس شاکی است. اقدام مناسب در این بیمار کدام است؟

درمان انتظاری

افزایش دوز مسکن

خارج کردن بخیه فاشیایی ✓

استفاده از شل کننده های عضلانی

منبع:

نواک 2020

آزمون: اختلالات کف لگن در زنان مدت آزمون: 120

۷۵- خانمی 35 ساله با سابقه دو بار سزارین ، تحت لاپاروسکوپی جهت جراحی کیست تخمدان قرار گرفته است. 48 ساعت بعد از عمل دچار تهوع و استفراغ شده و در معاینه، شکم متسع می باشد. توصیه شما جهت ارزیابی مناسب این بیمار کدام است؟

لاپاراتومی اورژانس

درمان انتظاری و بررسی مجدد 24 ساعت بعد

انجام سی تی اسکن با ماده حاجب ✓

گذاشتن رکتال تیوب

منبع:

نواک 2020

۷۶- در زمان رزکشن پولیپ حین هیستروسکوپی ، حوزه دید جراح از بین می رود و حفره آندومتر به طور تپیک متسع نمی شود. اقدام مناسب در این زمان کدام است؟

افزایش فشار مایع جهت اتساع بهتر

تغییر نوع مدیای متسع کننده رحم

توقف جراحی و اقدام به لاپاروتومی ✓

توقف عمل و تحت نظر گرفتن بیمار

منبع:

نواک 2020

۷۷- بیمار خانم 25 ساله شیرده با ریتارد پریود مراجعه کرده است. در سونوگرافی توده 5 سانتیمتری آدنکس چپ مبنی بر EP زنده گزارش شده است. در آزمایشات $Hb = 7.5$, $BHCG = 6000\text{mIU}$ دارد. کدام مورد زیر کنترانیدیکاسیون مطلق جهت تزریق متوتروکسات برای بیمار فوق می باشد؟

توده 5 سانتی متری

EP زنده

$Hb = 7.5$ ✓

$BHCG = 6000$

منبع:

نواک 2020

۷۸- رابطه بین جهش ژن BRCA1 و خطر ابتلا به کانسر پستان به کدامیک از معیارهای زیر اشاره دارد؟

Consistency

Strength ✓

Experience

Temporality

منبع:

نواک 2020

۷۹- در روند اولیه بررسی خانم 25 ساله که با خونریزی واژینال مراجعه کرده است کدام مناسب نمی باشد؟

CBC

PaP Smear ✓

BHCG

STD testing

منبع:

نواک 2020

۸۰- بیماری 65 ساله به دلیل پاپ اسمیر غیرطبیعی مراجعه کرده است. در معاینه سرویکس نرمال است و در بررسی کولپوسکوپیک سرویکس و واژن ضایعات با پترن موزاییک در فرورفتگی کاف واژن مشهود است. اقدام ارجح کدام است؟

کرایوسرجری

اکسیژون ✓

واژینکتومی توتال

لیزر

منبع:

نواک 2020

۸۱- دختری 15 ساله به دلیل عدم منارک و عدم بروز صفات ثانویه جنسی به شما مراجعه می کند. معاینه ژنیتالیا نرمال است. اولین اقدام تشخیصی در بیمار چیست؟

اندازه گیری FSH ✓

بررسی کاربوتیپ

در خواست MRI

اندازه گیری TSH

منبع:

نواک 2020

۸۲- در تمام گزینه‌های زیر می‌توان اطلاعات سلامت بیمار را از پرونده بیمار بدون اجازه بدست آورد، بجز :

پرداخت هزینه‌ها

آشکار کردن برای اداره سلامت عمومی

بهبود کیفیت آموزش

نگرانی خانواده



منبع:

نواک 2020

۸۳- برای بیماری که به علت ضایعات ناحیه تناسلی مراجعه کرده تشخیص وارت تناسلی داده شده است. بیمار تمایل به استفاده از درمان دارویی در منزل دارد. کدام گزینه درمانی را به بیمار پیشنهاد می‌کنیم؟

پدوفیلوکس ۰.۵٪



اینترفرون

تری‌کلرواستیک اسید ۰.۸٪

پدوفیلین ۱۰٪

منبع:

نواک 2020

۸۴- بیمار خانم ۴۵ ساله با شکایت لمس توده در پستان مراجعه کرده است. بعد از انجام معاینه توده نرم، متحرک همراه با تندرns لمس می‌شود. بعد از انجام ماموگرافی و سونوگرافی به علت علامت‌دار بودن، بیمار تحت آسپیراسیون کیست مذکور قرار گرفت. در صورت تمام مشاهدات زیر بعد از آسپیراسیون نیاز به بیوپسی بافتی می‌باشد بجز :

وجود توده در داخل کیست

مایع کیست سبز رنگ



مایع کیست غلیظ

عدم به‌دست آمدن مایع از کیست

منبع:

نواک 2020

۸۵- مصرف کدامیک از داروهای ذیل منجر به نتایج گمراه کننده تستهای تیروئیدی می‌شود؟

داروهای استروژنی



کلستیرامین

آلومینیوم هیوروکساید

فروس سولفات

منبع:

نواک 2020

۸۶- حین پوزیشن دادن بیمار برای انجام هیستریکتومی واژینال اقدامات زیر انجام شد. باسن بیمار جلوتر از لبه تخت قرار گرفت، فلکشن هیپ بیش‌تر از ۶۰ درجه و زاویه زانوها بین ۹۰ تا ۱۲۰ درجه و وضعیت تلندرنبرگ در ۱۰ تا ۱۵ درجه قرار گرفت. همه اقدامات زیر در این بیمار صحیح بوده است بجز :

- ✓ باسن بیمار جلوتر از لبه تخت
- فلکسیون هیپ بیش‌تر از ۶۰ درجه
- زاویه زانوها بین ۹۰ تا ۱۲۰ درجه
- وضعیت ترندلنبرگ ۱۰ تا ۱۵ درجه

منبع:

نواک 2020

۸۷- بیمار خانم ۳۸ ساله با آمنوره اولیه، خشکی واژن و گرگرفتگی مراجعه کرده است. معاینه واژن و سرویکس نرمال است و BHCG منفی می‌باشد. برای ارزیابی وضعیت استروژنی در بیمار تمام اقدامات زیر کمک‌کننده است بجز :

- بررسی ترشحات واژینال
- چک سطح استرادیول
- مشاهده آندومتر در سونوگرافی
- ✓ تست روبرویی با پروژسترون

منبع:

نواک 2020

۸۸- برای خانم 38 ساله NG با پرولاپس آپیکال رحمی، جراحی APR + Sacrospinous Suspension انجام شده است و برای خانم 72 ساله دیابتی مولتی پار با همان شکایت جراحی الکتیو لفورت انجام دادیم. این تنوع بالینی درمانی را چه می نامند؟

- غیرقابل توجیه
- ✓ ضروری
- ناخواسته
- مطلوب

منبع:

نواک 2020

۸۹- خانمی با شکایت نشت ادرار در زمان ارگاسم مراجعه کرده است. در بررسی بیشتر مشخص شد که وی در زمان ارگاسم دچار فعالیت بیش از حد و مهار نشده دترسور می شود و منجر به نشت ادرار می گردد. کدام درمان برای وی مناسب است؟

✓ عدم نیاز به درمان

سولیفناسین

پرازوسین

تولترودین

منبع:

نواک 2020

۹۰- خانم 55 ساله با سابقه خانوادگی Breast Cancer جهت غربالگری مراجعه کرده است. وی تمایل به بررسی دقیق با حساسیت بالا و نتایج مثبت کاذب کم دارد. کدام روش را توصیه می کنید؟

معاینه دستی پزشک

ماموگرافی اسکرین

توموستنز

سونوگرافی دو بعدی

منبع:

نواک 2020

۹۱- در انتهای جراحی هیستریکتومی واژینال، انجام اقدامات زیر توصیه می شود بجز؟

کلدوپلاستی مک کال

ترمیم کاف واژن

عدم پیک کردن واژن

✓ عبور بخیه های کاف واژن از میان مک کال کلدوپلاستی

منبع:

نواک 2020

۹۲- در گروههای زیر درمان هیپوتیروئیدی تحت بالینی با لووتیروکسین توصیه می گردد بجز؟

حاملگی

هیپرلیپیدمی شدید

اعتیاد شدید به دخانیات

✓ دیابت کنترل نشده

منبع:

نواک 2020

آزمون: اختلالات کف لگن در زنان مدت آزمون: 120

۹۳- بیماری روز بعد عمل ساسپنشن High Uterosacral از بی حسی ناحیه پرینه شکایت دارد. کدامیک از ریشه های عصبی زیر درگیر شده است؟

L4

L5

S1

S3



منبع:

نواک 2020

۹۴- پزشک متخصص زنان یک مطالعه کارآزمایی بالینی با تعداد جمعیت حدود 80 نفر در مورد تعیین دوز مناسب تزریق بوتاکس جهت سندرم مثانه بیش فعال ترتیب داده است. مطالعه در چه فازی قرار دارد؟

فاز 1



فاز 2

فاز 3

فاز 4

منبع:

نواک 2020

۹۵- دختر بچه 7ساله با ضایعه سفیدرنگ ولو همراه با خارش و سوزش در ناحیه، کاهش چربی زیرپوستی لابیاهاى نازک مراجعه کرده است. اقدام درمانی مناسب کدام است؟

استروئید موضعی High potent



ویتامین A موضعی

استروژن موضعی

اریترومایسین موضعی

منبع:

نواک 2020

۹۶- ۵- خانم ۶۷ ساله با احتباس حاد ادرار مراجعه نموده است در سونوگرافی حجم ادرار ۷۰۰ برآورد شده است. جهت کاتتریزاسیون مثانه کدام اقدام ضروری نمی باشد؟

- ✓ عدم تخلیه سریع ادرار
- بررسی آزمایشات خون ادرار و کراتینین
- بررسی نورولوژیک
- گذاشتن کاتتر فولی برای ۷ روز

منبع:

UP TO DATE 2022

۹۷- خانم 60 ساله G3P3 با شکایت علائم OAB (مثانه بیش فعال) مراجعه کرده است. بعد از ارزیابی های اولیه توصیه به درمان کنزرواتو (Bladder training) می شود. کدامیک از اقدامات زیر در Bladder training صحیح می باشد؟

- ✓ به محض بروز تمایل قوی به ادرار کردن به دستشویی برود
- به صورت دو مرحله ای ادرار کند
- هر روز 5 دقیقه به فواصل دفع ادرار اضافه کند
- حداکثر یک دوره 4 هفته انجام دهد

منبع:

نواک 2020

۹۸- خانم 21 ساله ای که با شکایت از دیس پارونیا به دلیل سپتوم طولی واژن مراجعه کرده، تحت جراحی جهت برداشتن سپتوم واژن به روش clamp/cut قرار می گیرد. برای هموستاز و دوختن لبه های بریده شده، از کدام روش زیر استفاده می کنید؟

- تنها کنترل لبه های خونریزی دهنده با کوتر
- ✓ Interrupted sutures
- Running sutures
- Running locked sutures

منبع:

تلیند 2020

۹۹- در سیستم POP-Q نقطه Ba در یک خانم بدون پرولاپس کجای واژن قرار دارد؟

- منطبق با هایمن
- ✓ دیواره قدامی واژن 3 سانتی متر بالاتر از هایمن
- منطبق با فورنیکس قدامی
- منطبق با فورنیکس خلفی

منبع:

نواک 2020

۱۰۰- کدام یک از اقدامات زیر می تواند شانس عفونت زخم پس از جراحی را کاهش دهد؟

ادامه آنتی بیوتیک پروفیلاکسی 24 ساعت پس از جراحی

✓ حفظ دمای نرمال بیمار

استفاده از سالین جهت شستشوی واژن

برداشتن پانسمان طی 24 ساعت اول

منبع:

تلیندز 2020